

# 腹膜透析を受ける患者様へ

患者名 @PATIENTNAME 様

主治医:

担当看護師:

在宅復帰支援担当者:

病名	慢性腎不全→腹膜透析導入		(SPIED法)	平成 年 月 日			
日時	/	/	/	/	/	/	/
経過	入院	手術	手術翌日		入院 約1週間後		退院
治療・薬剤 (点滴・内服)		持続点滴 術前筋肉注射 抗生剤点滴	状態に合わせて 腹膜透析開始に なることもあり				自宅での透析 サイクルを確認
処置	毎日体重測定	→	ガーゼ交換 →	→	CAPD500ml X1~2回 →	状態に合わせ て液量変更 →	→
検査		術後X線 (KUB)		以後、採血, X線写真適宜	排液検査適宜		
安静度	病院内フリー	術後病棟内歩行可	病院内フリー	→	→	→	
水分制限							
食事	腎不全食	昼のみ1/2	腹膜透析食	→	→	(栄養指導)	
清潔		必要に応じ剃毛	全身清拭	→	→	(医師の指示後) 入 浴・出口部ケア 指 導	出口部ケア物品 の確認
排泄	蓄尿	→	→	→	→	→	
目標	CAPDの手技を正しく行うことができ、移乗時の対処ができる。 在宅で安心して治療ができるよう、知識を充足する。						

病名、入院期間等は現時点で考えられるものであり、治療、検査等を進めるにしたがって変わることがあります。

市立四日市病院