

お名前 @PATIENTNAME 様

本人・家族

月 日	／	／
経過	手術当日(手術後)	手術後1日
達成目標	◇血圧、脈拍、体温、酸素の値が安定する ◇安静に伴う痛みが軽減できる ◇夜間、入眠できる ◇ドレーンからの出血が少ない(ドレーンが入る場合)	
治療・薬剤	点滴ルート(首の血管から入っています) 心電図 酸素吸入 (酸素の値が良く、口の管が抜けていればマスクによる酸素投与) 体外式ペースメーカー(首の血管から管が入っています) (不整脈がなければ外れます) 体温計(腹部と足の裏) ドレーン(体内にたまる血液や滲出液を体外に排出する管) ※ドレーンは入らない場合もあります	(酸素の値が良ければ鼻からの酸素に変わります) 体温が安定したら外れます
検査	採血、レントゲン、心電図があります	採血、レントゲン、心電図があります
活動・安静度	ベッドを起こして座ることができます。(足の付け根に管がある場合は起こせません)	痛みのコントロールができていれば、ベッドに腰をかけて座ることができます
食事	手術当日は食事を食べることはできません	医師の許可が出たら飲水から始めます。飲水ができれば食事が始まります。内服も再開します
清潔	手術当日は手術着のまま過ごします	身体を拭いて着替えます(体重測定も実施)
排泄	手術中より尿道カテーテルが入ってきます (正確な尿量を把握する目的があります)	
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	手術直後、医師より手術結果の説明があります。 手術後、痛みや吐き気がありましたらお知らせください。 一般病棟とは異なる環境や高齢である事、また、治療のため多くの管が入る事で、せん妄症状を起こす事があります。 安全に過ごして頂けるよう関わらせて頂きます。	一般病棟へ戻ります 

